2023年度 水稲栽培ごよみ

芸南農業協同組合
全国農業協同組合連合会 広島県本部
●業務部経済課 TEL(0846)45-3360　●営農センター TEL(0846)46-1017　●安浦支所経済 TEL(0823)84-2049　●川尻支所経済 TEL(0823)87-2931

農薬飛散防止・異品種混入防止の作業管理

JA米の取組み（種子更新100%・栽培管理記録・JAでの米検査）

育苗の手順

※育苗箱消毒を行う
イチバン乳剤　500倍

塩水選 → 水洗いで塩分を取る → 種子消毒 → 陰干し → 浸種 → 芽出し

（生卵を使った濃度の確認）



水10ℓに並塩2.1kg入れると(1.13)
水10ℓに並塩1.3kg入れると(1.08)

消毒後は水洗いしない。



ネット12時間
バ ラ 6時間

かげ干しを行う

○5～6日
○流水ではしない。
○浸種開始後2日間は水を換えない。その後は1日1回交換。
○水の交換は静かに日陰で行う。

催芽温度
28～30℃
催芽時間
18～15時間



正しいハト胸

・催芽もみは1箱に180gは種

・ナエファインフロアブル1000倍を1箱に0.5L散布(100mlで200箱できます。)
苗立枯病
(ビシウム・フザリウム・リゾープス)菌
ムレ苗防止・根の生育活着促進



◎目やすとする稚苗・中苗の大きさ



品種の特性表

品種名	田植月日	出穂月日	成熟月日	稈長cm
ヒノヒカリ	5.30	8.24	10.7	83
コシヒカリ	5.15	7.28	9.6	86

2～3日
温度管理
昼20～25℃
夜15～18℃
○箱は苗床に密着させるように置く。
○日中30℃以上にならないように換気。

	4月	5月			6月			7月			8月			9月			10月	11月～3月
	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		

コシヒカリ 施肥設計（10aあたり）

倒伏防止・品質向上のため、基肥または追肥に「けい酸加里」を施用しましょう



省力型
側条施肥の場合 基準量の2割減量
- 早生い～ね755 35kg
- けい酸加里プレミア34 30～40kg

従来型
- い～ね403「改」(14-10-13) 25kg
- けい酸加里プレミア34 20～40kg 出穂40～35日前
- い～ね707「改」(17-0-17) 10kg

○刈り取りは、バインダーで青もみ率10%になった時、コンバインはこれより3～4日おくらせる。
○水分は15.0%を目標に。

ヒノヒカリ 施肥設計（10aあたり）



省力型
側条施肥の場合 基準量の2割減量
- 中生い～ね755 55kg
- けい酸加里プレミア34 30～40kg

従来型
- 固形35号 (10-15-10) 40kg
- い～ね403「改」(14-10-13) 30kg
- 追肥 田植後 い～ね403「改」(14-10-13) 10kg 15～20日
- けい酸加里プレミア34 20～40kg 出穂40～35日前
- 穂肥①出穂前 固形23号 (10-3-10) 40kg 24～20日
- 穂肥①出穂前 い～ね707「改」(17-0-17) 20kg 24～20日

※田植前のけい畔の雑草対策にはカーメックスDを使用。

土づくりを開始しましょう

良質米は土づくりから！

1.生ワラは年内に鋤き込む。
2.排水を良くしておく。
3.土づくり肥料を施用して深耕する。
4.漏水田にはベントナイトを1000kg施用する。

土づくり肥料名	10a当りの使用量	効果・適用水田等
生ワラ腐食促進剤【稲刈り後なるべく早く】		
石灰窒素(粒)	20kg (1袋)	年内に生ワラの上に散布してすき込みます。土壌微生物の増殖が早まり、有機物の腐熟を促進します。
アグリ革命(粒)	2kg (1袋)	酵素資材のため、土壌環境に影響されることなく、浮ワラ、ガス沸きを減少。
秋の土づくり【10月～12月まで】		
ケイカル(粒)	200kg (10袋)	茎葉が丈夫になり、倒伏や病害に対する抵抗性が向上します。また、根が丈夫になり登熟歩合が向上します。
ミネリッチ(粒)	100kg (5袋)	ケイ酸、苦土成分が高く、リン酸や加里の肥効を高める。ケイ酸は茎葉を丈夫にし、鉄・マンガンは根腐れを防止し、倒伏軽減や病害虫に対する抵抗性を高める。
ミネラルG(粒)	200kg (10袋)	ケイ酸・鉄分・石灰・苦土・マンガンなどの必要成分のバランス良く含有されているので、相乗作用により増収と品質向上に役立ちます。
地力増進【10月～2月まで】		
牛フン堆肥	1t	土壌構造の改善。保肥力の増加。コシの場合は10月～2月の間にすき込む。
春の土づくり 秋の土づくり【3月～荒起こし前まで】		
ようりん(粒)	20kg (1袋)	リン酸は根の健全な生育と分けつや子実の充実を進める働きがあります。ゆっくり長く効くリン酸肥料で、苦土やケイ酸も含みます。
土楽園(粒)	60kg (6袋)	リン酸・加里・ケイ酸・鉄分・苦土が一度に補給できる、省力型土づくり肥料です。散布量が少なく、倒伏軽減・冷害や病害に対する抵抗性を高めます。

病害虫防除

基幹防除

		苗の箱処理防除	粉剤	粒剤	豆つぶ剤	液剤
例1		●フルスロットル箱粒剤 〔対応病害〕紋枯病 いもち病・白葉枯病 もみ枯細菌病 ウンカ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ イネツトムシ イネミズゾウムシ ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ コブノメイガ	トレバリダビーム粉剤DL (3～4kg/10a)(収穫14日前まで) いもち病・紋枯病 カメムシ類・ウンカ類・ツマグロヨコバイ			
例2				ゴウケツモンスター粒剤 (3kg/10a) (出穂5日前まで、但し収穫45日前まで) いもち病・紋枯病・稲こうじ病 ウンカ類・カメムシ類 ツマグロヨコバイ・もみ枯細菌病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)		
例3		●防人(さきもり)箱粒剤 〔対応病害〕いもち病・白葉枯病 もみ枯細菌病 ウンカ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ イネツトムシ イネミズゾウムシ ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ コブノメイガ			ワイドパンチ豆つぶ (250g/10a)(収穫35日前まで) いもち病・紋枯病 稲こうじ病・ごま葉枯れ病 カメムシ類・ウンカ類	
例4						アミスタートレボンSE (1,000倍) (収穫14日前まで) いもち病・紋枯病 ウンカ類・カメムシ類
空中散布	例5			アミスタートレボンSE (8倍)(穂揃期まで)		

出穂期

	ブラシンキラップ粉剤DL	スタークル粉剤
	(3～4kg/10a)(収穫14日前まで) いもち病・ごま葉枯病 ウンカ類・カメムシ類	(3kg/10a) (収穫7日前まで) カメムシ類・ウンカ類 ツマグロヨコバイ
	スタークル粒剤 (3kg/10a) (収穫7日前まで) カメムシ類・ウンカ類 ツマグロヨコバイ	
	スタークル豆つぶ (250～500g/10a) (収穫7日前まで) カメムシ類・ウンカ類 ツマグロヨコバイ	
	ダブルカットスタークルフロアブル (1,000倍)(穂揃期まで) (収穫7日前まで) いもち病 カメムシ類・ウンカ類・ツマグロヨコバイ	
	ダブルカットスタークルフロアブル (8倍)(穂揃期まで)	

補完防除

- **いもち病**：ブラシン粉剤DL 3～4kg/10a(収穫7日前まで)
- **紋枯病**：バリダシン粉剤DL 3～4kg/10a(収穫14日前まで)
- **ウンカ類・イネミズゾウムシ・イネドロオイムシ・ツマグロヨコバイ・ニカメイチュウ・コブノメイガ**：バダントレボン粒剤L 3kg/10a(収穫30日前まで)
- **カメムシ類・ウンカ類**：トレボン粉剤DL 3～4kg/10a(収穫7日前まで)

農薬は正しく安全に使いましょう



※散布当日は健康状態に注意しよう。
※使用する農薬のラベルをよく読もう。
※服装に注意しよう。
※涼しい時を選んで散布しよう。
※長時間の散布は避けよう。
※散布後は石鹸で顔や手足をよく洗い、うがいをしよう。
※めまい、吐き気など感じたら必ずお医者にかかろう。
※農薬専用の保管庫に収納し、必ずカギをかけよう。
※散布日には風向きに気を付け、近くに家があるときは一声かけて。

※必ず、生産工程管理日誌を提出しましょう。

除草剤

薬剤名			10aあたりの使用量	除草効果 ノビエ	除草効果 広葉	代かき -10 -9 -8 -7	田植 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
体系防除 フロアブル	ピラクロンフロアブル 500ml/10a	粒剤 カイリキZ1キロ粒剤	1kg	3葉	◎	植代時～田植前7日 500ml/10a	移植後5日～25日　ノビエ3葉期まで
		フロアブル ジェイフレンドフロアブル	500ml	3葉	◎		移植後5日～25日　ノビエ3葉期まで
		投げ込み カイリキZジャンボ	10個 (300g)	3葉	◎		移植後5日～25日　ノビエ3葉期まで
難防除雑草	クリアホープフロアブル	粒剤 天空1キロ粒剤	1kg	3葉	◎		移植後5日～25日　ノビエ3葉期まで
		フロアブル 天空フロアブル	500ml	3葉	◎		移植後5日～25日　ノビエ3葉期まで
		投げ込み 天空ジャンボ	10個 (300g)	3葉	◎		移植後5日～25日　ノビエ3葉期まで
一発処理		粒剤 カイリキZ1キロ粒剤	1kg	3葉	◎		移植直後～15日　ノビエ3葉期まで
		フロアブル ジェイフレンドフロアブル	500ml	3葉	◎		移植直後5日～15日　ノビエ3葉期まで
		投げ込み カイリキZジャンボ	10個 (300g)	3葉	◎		移植後3日～15日　ノビエ3葉期まで
		難防除 天空ジャンボ	10個 (300g)	3葉	◎		移植後1日～15日　ノビエ3葉期まで

◎藻類・表層剥離　ウキクサ対策
・モゲトン粒剤
3kg/10a
(収穫45日前まで)

◎ヒエおよび広葉雑草が残った場合
・レブラス1キロ粒剤　・ゲパードジャンボ
1kg/10a　10個(400g)/10a
移植後14日～ノビエ4葉期　移植後14日～ノビエ4葉期
(収穫60日前まで)湛水散布　(収穫60日前まで)湛水処理

◎広葉雑草が残った場合
・バサグラン粒剤
3～4kg/10a
移植後15日～55日
(収穫60日前まで)落水散布

◎ヒエが残った場合
・トドメMF粒剤
1kg/10a
移植後14日～ノビエ5葉期
(収穫50日前まで)湛水散布

※毒物・劇物の農薬を購入される場合は、印鑑が必要です。農薬の譲渡は危害防止のため直接手渡しで行います。