

ひろしま農業協同組合芸南地域本部
全国農業協同組合連合会 広島県本部

●川尻店経済 TEL(0823)87-2931

※育苗箱消毒を行う
イチバン乳剤 500倍



・ナエファインフロアブル1000倍を
1箱に0.5L散布(100mlで200箱できます。)
苗立枯病
(ピシウム・フザリウム・リゾープス)菌
ムレ苗防止・根の生育活着促進

2～3日
温度管理
昼20～25℃
夜15～18℃
○箱は苗床に密着させるように置く。
○日中30℃以上にならないように換気。

11月～3月		
良質米は土づくりから！		
1. 生ワラは稲刈後なるべく早く年内にすき込む。 2. 排水を良くしておく。 3. 土づくり肥料を施用して深耕する。 4. 漏水田にはベントナイトを1000kg施用する。		
土づくり肥料名	10a当りの 使用量	効果・適用水田等
生ワラ腐食促進剤【稲刈後なるべく早く年内に】		
石灰窒素(粒)	20kg (1袋)	年内に生ワラの上に散布してすき込みます。 土壌微生物の増殖が早まり、有機物の腐熟を促進します。
アグリ革命(粒)	2kg (1袋)	酵素資材のため、土壌環境に影響されることなく、浮ワラ、ガス沸きを減少。
秋の土づくり【10月～12月まで】		
ケイカル(粒)	200kg (10袋)	茎葉が丈夫になり、倒伏や病害に対する抵抗性が向上します。 また、根が丈夫になり登熟歩合が向上します。
ミネリッチ(粒)	100kg (5袋)	ケイ酸、珪土成分が高く、リン酸や加里的肥効を高める。ケイ酸は茎葉を丈夫にし、鉄・マンガンは根腐れを防止し、倒伏軽減や病害虫に対する抵抗性を高める。
ミネラルG(粒)	200kg (10袋)	ケイ酸・鉄分・石灰・珪土・マンガンの必要成分のバランス良く含有されているので、相乗作用により増収と品質向上に役立ちます。
地力増進【10月～2月まで】		
牛フン堆肥	1t	土壌構造の改善、保肥力の増加。 コシの場合は10月～2月の間にすき込む。
春の土づくり 秋の土づくり【3月～荒起こし前まで】		
ようりん(粒)	20kg (1袋)	リン酸は根の健全な生育と分けつや子葉の充実を進める働きがあります。 ゆっくり長く効くリン酸肥料で、珪土やケイ酸も含まれます。
土楽園(粒)	60kg (6袋)	リン酸・加里・ケイ酸・鉄分・珪土が一度に補給できる、省型力すくり肥料です。 散布量が少なく、倒伏軽減、冷害や病害に対する抵抗性を高めます。

スタークル粉剤 (3kg/10a) (収穫7日前まで) カメムシ類・ウンカ類 ツマグロヨコバイ			
---	--	--	--

[illegible]

※散布当日は健康状態に注意しよう。

※使用する農薬のラベルをよく読もう。

※服装に注意しよう。

※涼しい時を選んで散布しよう。

※長時間の散布は避けよう。

※散布後は石鹸で顔や手足をよく洗い、うがいをしよう。

※めまい、吐き気など感じたら必ずお医者にかかろう。

※農薬専用の保管庫に収納し、必ずカギをかけよう。

※散布日には風向きに気を付け、近くに家があるときは一声かけて。

※必ず、生産工程管理日誌を提出しましょう。

					代かき											田植																										
田植前 除草剤		除草剤		薬剤名	10aあたりの 使用量	除草効果 ノビエ広葉	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
田植前 除草剤 10a あたりの 使用量 カーメックスフロ ※お苗を植える前に必ず布	体系防除 フロアブル 難防除雑草	ピラクロンフロアブル 500ml/10a	粒剤	カイリキZ1キロ粒剤	1kg	3葉 ◎	植代時～田植前7日 500ml/10a										移植後5日～25日 ノビエ3葉期まで																									
			ジェイフレンドフロアブル	500ml	3葉 ◎																																					
			播種	カイリキZジャンボ	10個 (300g)	3葉 ◎																																				
			粒剤	天空1キロ粒剤	1kg	3葉 ◎																																				
			天空フロアブル	500ml	3葉 ◎																																					
		天空ジャンボ	10個 (300g)	3葉 ◎																																						

◎藻類・表層剝離 ・モゲトン粒剤 3kg/10a(収穫45日前まで)	ウキウサ対策
◎ヒエオ白ひ葉雑草が残った場合 ・レプラス1キロ粒剤 1kg/10a 移植後14日～ベジA5葉期 (収穫60日前まで)湛水散布	・ゲードジャンボ 10個(400g)/10a 移植後14日～ベジA5葉期 (収穫60日前まで)湛水処理
◎広葉雑草が残った場合 ・バサグラン粒剤 3~4kg/10a 移植後15日～55日 (収穫60日前まで)湛水散布	◎ヒエが残った場合 ・トドMF粒剤 1kg/10a 移植後14日～ベジ5葉期 (収穫55日前まで)湛水散布

※毒物・劇物の農薬を購入される場合は、印鑑が必要です。農薬の譲渡は危害防止のため直接手渡しで行います。