



## 「海辺のふれあい祭り」盛大に開催！

### ●地域とともに

J A川尻支店は、地域の方の協力のもと2月10日に「海辺のふれあい祭り」を行ないました。

産直市には、新鮮な野菜や柑橘、朝水揚げされた鮮魚が並びました。

イベントでは、川尻支店ふれあい委員会のメンバーによる原木シイタケの菌打ち講習と実演販売や、地元有志による「手打ちそば」、老人会の「シシ鍋」、J A青壮年連盟芸南地区本部川尻支部の盟友が「ぜんざい」をふるまい、祭りに花を添えました。



## 芸南地域 おまつり特集



## 「柑橘まつり」盛大に開催！



### ●柑橘シーズンのラストを飾る

J Aふれあい市安芸津店は、2月23日「柑橘まつり」を行ないました。

柑橘シーズンのラストを飾る「せとか」「はっさく」「しらぬひ」や、採れたて新鮮野菜などが並びました。また、同時に飲食ブースや生活用品も揃えたプチイベントも開催しました。当日はあいにくの天気にもかかわらず、旬の柑橘や野菜を求めて大勢の人が訪れ賑わいました。



## 「安浦ふれあい祭り」盛大に開催！

### ●地域に感謝の気持ちを込めて

J A安浦支店は、3月9日に「安浦ふれあい祭り」を行ないました。

当日は、啓蟄が過ぎたとはいえ寒い一日でしたが、青空市では旬の野菜や柑橘を目当てに多くの人々が訪れました。また、恒例のたまねぎ詰め放題では、1つでも多く詰めようと、来場者が奮闘しました。

安浦支店ふれあい委員会のメンバーは、「豚汁」のふるまいや、子どもに人気の「わたがし」の実演で、祭りに花を添えました。





# なるほどえ〜のう！ 営農情報

## 水稲 4月

田植えに備え、いつでも水が入られるように最後の耕起を行ないましょう。早生いぐね、中生いぐねなどの一発型の省力肥料は、この機会に施肥してから（均一に施肥をする）耕起すると水張り後に行なう必要がなくなり、施肥作業が楽になります。

また、倒伏防止・品質向上をめざし、けい酸加里の施用をおすすめしています。元肥の場合10a当たり20〜40kgを使用してください。

### 種子の管理

ばか苗病・いもち病・もみ枯細菌病・イネシンガレセンチュウを予防するために必ず種子消毒を行ないましょう。

種子消毒前には必ず塩水選を行ない、不良もみを除いておきましょう。テクリードCフロアブル2000倍液とスミチオン乳剤1,000倍液を24時間混用浸漬後、半日程度陰干し、5〜6日浸種して、芽出しを行ないましょう。（※苗つくりについては水稲

### 開花期防除

開花期の被害は果実肥大とともに拡大し、成歩率低下の大きな原因になります。

開花期防除は3回以上行ない、外観のきれいな果実を生産しましょう。

- ①開花初期：開花の早い品種（極早生・早生・いしじ）や園地では、訪花害虫（コアオハナムグリやケシキスイ類等）に被害されやすいため、オリオン水和剤40（劇）1,000倍液を散布しましょう。
- ②5分咲期：灰色かび病と訪花害虫対策として、パレード15フロアブル3,000倍液とエムダイファール水600倍液とタニ対策としてアグリメック（劇）2,000倍液を混用して散布しましょう。
- ③落弁期：灰色かび病と黒点病対策として、ストロビドドライフロアブル3,000倍液とエムダイファール水600倍液とタニ対策としてアグリメック（劇）2,000倍液を混用して散布しましょう。
- ④固着性展着剤アピオンE1,000倍液を混用し、付着性及び耐雨性を高めましょう。

### 葉面散布

早めの緑化を促し光合成能力を高めるため、開花期防除と併せて元気一番1,000倍液とマグミーフe6000倍液を混用して散布しましょう。

### ミカンの芽かき・開花後の弱剪定

着花量が少なく予想される樹では生理落果を防ぐため、一力所から複数本出ている新梢を減らす芽かき処理と合わせて、着花枝に被さった新梢や新葉の多い枝又は徒長枝を間引く弱剪定

栽培ごよみをご参照ください

水稲 問 安浦店  
TEL 0823-84-2049  
担当 桑原 伸明

## 野菜 4月

### 馬鈴しょ

初期生育を促進するために、追肥を行ないます。発芽がそろった時期になったら、馬鈴しょ化成S30を10a当たり60kg施用し中耕します。

その後、肥大促進といもの露出を少なくするため、土寄せをし、畝をしっかりと立てましょう。病害虫防除ではアブラムシ・疫病の初期防除が大切です。発芽揃い後の早めの防除をしましょう。特に種子馬鈴しょはアブラムシが媒介するウイルスを入れないため、防除を徹底してください。

### 病害虫防除例（生育初期〜中期）

アブラムシ・ヨトウムシ

モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍液（使用は収穫7日前まで、使用回数3回以内）

### えき病（初期防除）

ジマンダイゼン水和剤 500倍液（予防剤。使用は収穫7日前まで、使用回数10回以内）

※えき病は成育前半の着蕾期（つぼみのつく時期）までに早期予防をすることで最も効果が得られます。初期防除の後、2週間前後で早めに2回目の防除を行なうことを心がけま

を実施しましょう。

### 中晩柑類のかいよう病防除

前年にかいよう病が多発した園地では開花期防除の他に、コサイド30002,000倍液とクレフノン2000倍液を混用して散布しましょう。当病害は、若木で発生しやすいため、注意しましょう。

### 夏肥の施用

5月下旬の夏肥が最も施肥効率が良く効果的です。

施肥基準は栽培管理指針を参考にし、基準量を施用しましょう。

### 苗木管理

①芽かき：開心自然形で仕立てる場合は、接ぎ木部7芽〜8芽から出る芽は全てかき取り、他は配置良く3本の新芽だけを残して他の芽はかき取りましょう。

②施肥：植え付け1ヵ月後から元気866を40g程度（約1握り）1ヵ月おきに施用しましょう。

③葉面散布：尿素600倍液を7日〜10日おきに散布しましょう。併せて葉面マグ600倍液を混用し、春芽の緑化促進を図りましょう。

### びわ

かん水 雨が少なく乾燥が続くようであれば、10日間隔で10mm程度のかん水を実施しましょう。

### いちじく

芽かき 樹冠内が込み合い日陰になるのを防

しょう。

### えき病（2回目防除）

プロポーズ顆粒水和剤 1,000倍液（使用は収穫7日前まで、使用回数3回以内）

### 春野菜の定植

購入したポット苗は輸送等での根痛みや、植え付ける環境に慣れていないことがあります。すぐに定植せず、2〜3日自宅などで慣らし（順化といいますが）をしてから畑に定植しましょう。

また、病虫害の予防として、ダコニール1000（病気対策）・フレバソンプロアブル（害虫対策）などを苗に散布しておくとい良いでしょう。（使用する作物の登録・使用倍率を確認してください）

自宅で苗づくりをする場合は、まだ気温の低い日もありますので、定植一週間前までにはトンネル・ビニールキャップ・マルチ等を利用して保温し、根の発達を促し、活着しやすい苗をつくりましょう。（晴天の日は高温になるので、状況に応じて換気を行ないましょう）

また、害虫対策として、ダントツ粒剤、ジェイエース粒剤、ベストガード粒剤などを定植時に植え穴に処理します。毎回同じ粒剤を使用すると、効果が弱くなることあるので、前作の定植時に使ったものと異なる粒剤を使うと良いでしょう。（使用する作物の登録確認をしてください）

＜農業の使用基準を守り、生産工程管理日誌を必ず提出しましょう！＞  
農業の法律が厳格化しています。

ぐとともに、果実の生育促進・高品質果実生産のため、新しい芽の長さが5cm程度、展葉3枚程度で行ないましょう。その際、外芽や横芽を中心に残し、上向きの芽はかき取りましょう。樹勢の弱い樹については、上向きの芽を残しましょう。

### 病害虫防除

#### そうか病

そうか病は発育初期に感染しやすく、5月の降雨が多いと発病率も高くなります。また二次感染するため、4月に防除がされていない園地ではトッブジンM水和剤1,500倍液で早急に防除を実施しましょう。

### かん水

雨が少なく乾燥が続くようであれば、7日間隔で15mm程度のかん水を実施しましょう。

## 4月の野菜作付情報

安芸津アグリセンターでは、直売所などJA出荷者の支援として、128穴セルトレイでの野菜苗の生産・供給を行なっています。数に限りがありますので、お早目にお問い合わせ頂ぎぜひご利用ください。



128穴セルトレイ (商品例) キャベツ苗

### 今月の供給品目

品目名	品種名	販売予定	収穫予定
キャベツ	初秋	4月中旬〜	6月下旬〜

※在庫・価格等詳細については随時お問い合わせください。  
※特注品についても相談の上、対応致します。

果樹 問 安芸津アグリセンター  
TEL 0846-45-0488  
担当 広果連駐在技術員 栗木 富生

### 農業使用の注意点

- ・使用者自身の安全のため、農業の製品ラベルに従った保護具を着用しましょう。
- ・環境への安全のため、周辺住民や農家に配慮し掲示板などで農業の使用を事前に伝え、農業が飛散してかからないように注意しましょう。
- ・作物の残留農薬が問題となっており、決り、農薬の製品ラベルに従い、決められた作物種、使用量、使用時期、使用回数などを確実に守れば基準値を超えることはありません。

## 果樹 5月

### かんきつ

温州ミカン・中晩柑類の外観品位を損なう病害虫の発生時期となります。また肥効の良い夏肥の時期でもあります。開花期防除・夏肥の施用を徹底しましょう。

今年産のミカンは全体的に成りが少ない裏年となるため、生理落果を防ぎ、より多くの花を確保する必要があります。葉面散布・かん水をしっかりと行ないましょう。

### かん水

過乾燥は生理落花を助長するため、かん水を行ないましょう。



あなたとわたしの  
ふれあい市

自然に恵まれ「人と人との豊かな生活」がそこにある

# JAひろしま ふれあい市安芸津店

東広島市安芸津町風早647番地8

ふれあい市は、『農業者の所得増大』『農業生産の拡大』『地域の活性化』を基本目標とし、地産地消に取り組んでいます。



4月の  
おすすめ

春本番☆朝晩はまだ冷えますが、日中はずいぶんと暖くなりましたね☆  
寒暖の差が激しい時期なので旬の食材をとって元気に過ごしましょう！  
ふれあい市では「春」ならではの食材をそろえて、みなさまのお越しをお待ちしております。

山菜類もたくさん  
入荷しています



たけのこ



ふき



ゆらぎ



かんきつ

など店頭に並びます

ナス



ピーマン



そのほか夏野菜苗も  
取り揃えています



トマト



きゅうり

など

出荷会員募集中

自慢の農産物を出荷してみませんか？  
興味のある方は下記の連絡先までお問い合わせください。

☎0846-46-1166

ふれあい市安芸津店



※写真はイメージです。

## Information お知らせ

### 令和6年度の「ふれあい活動」日程について

JAひろしまでは、ふれあい活動に力を入れ、組合員の方や地域利用者の方との対話に取り組んでいます。  
芸南地域の「ふれあい活動」は、毎月第3週に行なっていましたが、令和6年度から毎月7日から14日までの間を「ふれあい活動週間」と定め、職員が訪問させていただきます。  
いただいたご意見、ご要望などは、本店総合企画部ふれあい課へ報告し、役員へ報告されます。