

かんきつ栽培暦

Main calendar table with columns for month,旬, and management tasks. Includes sections for '定期(基幹)防除', '追加防除', and '定期(基幹)および追加防除'. Contains detailed pesticide and fertilizer schedules for various citrus varieties like 'みかん', '中晩柑', and '温州みかん'.

◎ 施肥基準 ※収穫量に応じて施肥量は調整する。(温州みかん: 10a当たり生産量4トン目標の場合) (いしじ、中晩柑: 10a当たり生産量3トン目標の場合)

Fertilizer application table showing recommended amounts for Spring, Summer, and Autumn fertilizers for different citrus types and varieties.

※濃縮348は15kg入り。\*いしじの夏肥を元氣866または濃縮348で行う場合は、5月下旬と6月中旬に分給する。

Fertilizer application table for 'いしじ (省力化基準)' showing recommended amounts for Spring, Summer, and Autumn.

※元氣200を使用することで、施肥コスト低減を図る。\*元氣200で夏肥施用の場合、分給の必要はない。

Fertilizer application table for '中晩柑' showing recommended amounts for Spring, Summer, and Autumn.

※緩行性肥料の元氣200は年間3回施肥の省力化タイプ。

Fertilizer application table for '中晩柑' showing recommended amounts for Spring, Summer, and Autumn.

※使用時期と施用量を守り年1回の施用。

Table showing recommended amounts of fertilizer for different citrus varieties (1-year, 2-year, 3-year seedlings).

◎ 土壌改良資材 (有機物資材) 必要に応じていずれかの資材を施用 10a当たり施用量目安 豊穡...2トン アツミン...40~100kg 牛ふん(中晩柑)...1トン ココナツビート...100~200個

◎ 除草剤使用基準 ●ラウンドアップマックスロード 使用時期: 雑草生育期(収穫7日前まで) 使用回数: 3回以内

●バスタ液剤 使用時期: 雑草生育期(収穫21日前まで) 使用回数: 3回以内 100~200倍 [薬量10a当たり 500ml~1,000ml] 散布液量 10a当たり 100リットル

★農薬散布時の注意点★ ●風の無い時を選んで散布する ●近接作物に飛散しないように注意する ●散布の位置と方向に注意する ●使用時期・回数は基準に従い散布する ●散布機の圧力は適切にする ●残液は、海・川・池に流さない ●散布量は適切にする