

水稲

◎出穂後の管理

【水管理】

・出穂後20日間は圃場を乾燥させないように飽水状態（足跡に水がある状態）で管理しましょう。

・高温障害対策として、出穂期以降に日中の気温が35℃を超える場合や、熱帯夜が続くときは、かけ流しや走り水を行なうなどして、圃場内の温度を下げるようにしましょう。


・落水は出穂後30日頃を目安とし、落水後でも乾燥が続くときは走り水を行ないましょう。

【刈り取り時期】

・早生品種（コシヒカリ、ひとめぼれ等）は、出穂後35～40日、中生品種（中生新千本、あきるまん等）は、出穂後45～50日が目安です。

【収穫適期の目安】

・黄化もみ率が95％程度になったら刈



【判定方法】

圃場内で平均的な穂を10本観察します。

①1穂で青もみが5％程度残っている

②上から4本目の枝は、もみ全部が黄化

※10本中で8本が①、②の状態なら収穫開始。

り取り適期です。

【乾燥】

・刈り取り後、高水分の生籾を長時間放置しておくと、発酵し変色する恐れがあるので、速やかに乾燥機へ搬入し通風乾燥を行ないましょう。

・仕上げ水分は、14・5％を目標にしてください。

【調整】

・籾摺りは、ロールの調整を行ない、肌ずれや胴割れが発生しないようにしましょう。

・粒選別機は、選別能力以上の玄米を投入すると、選別不足になり、等級格付けに大きく影響するので、適切な張り込み量で籾摺りを行ないましょう。

・紙袋出荷時の重量は、袋の重量込みで、30・5kgです。計量機の調整をお願いします。

【異品種混入防止】

・異品種等の混入は、産地全体の信頼を失いますので、異なる品種を扱う場合、各作業機械の清掃を徹底してください。

【生産履歴の記載と提出】

・JA米の要件の一つである生産履歴につきましては、チェック項目を確認の上記帳し、出荷時に必ず提出をお願いします。

野菜

◎アスパラガスの今後の栽培管理

立茎後も、かん水や追肥等を十分に行ないましょう。

特に、梅雨時期～梅雨明け後の高温

や多湿の状態では、病害虫が発生しやすくなります。天候を見ながら計画的な防除を行ない、立茎後の樹勢を維持しましょう。

【かん水】

・夏場は蒸散量が多くなるので、毎日かん水しましょう。

・午前中のかん水に加えて夕方にかん水を行なうことにより、畝の表面の温度を下げる効果が期待できます。

【追肥】

・肥料切れによる樹勢低下にならないよう、定期的に追肥を行ないましょう。

・肥料は水に溶けて吸収されるため、追肥はかん水や雨に合わせて行ないましょう。

【病害虫防除】

・引き続き、病害では、茎枯病・斑点病・褐斑病、害虫では、アザミウマ類・ハスモンヨトウなどに注意し、防除を行ないましょう。

・気温が高い昼間の時間帯は避け、早朝や朝夕の涼しい時間帯に散布しましょう。

・防除薬剤の使用方法などの詳細については、JA営農指導員までお問い合わせください。

【液肥の葉面散布】

・高温時の親茎の樹勢維持、夏芽の収量アップを目的として、防除の際、葉面散布剤を混用しましょう。（葉面散布剤のみでの散布も可能）

・300ℓ/10aの散布が目安です。

（表1）アスパラガスの追肥の例

基 肥	追 肥
アスパラ太郎くん	約20日の間隔でアスパラ次郎くんを30kg/10a施用
ユートップ化成50号	
BBアスパラー発700	高収量を目指す場合は、アスパラ次郎くんを約20日の間隔で20kg/10a施用
BBアスパラー発N40	基本的に追肥不要

（表2）アスパラガス防除薬剤の一例

	防除薬剤	希釈倍数	主な適用病害虫
殺菌剤	ダコニール1000	1,000倍	茎枯病・斑点病・褐斑病
	アフェットフロアブル	2,000倍	
	ラリー水和剤	4,000倍	
殺虫剤	プレオフロアブル	1,000倍	ネギアザミウマ・ハスモンヨトウ・オオタバコガ
	ディアナSC	2,500～5,000倍	アザミウマ類・ハスモンヨトウ・オオタバコガ

（表3）アスパラガス葉面散布剤（液肥）の一例

葉面散布剤（液肥）	使用倍率
液肥ミニファイブ	500倍
葉友	1,000～1,500倍
メリット青	300倍
かきパック	500～1,000倍

※アミスター20フロアブル、ストロビーフロアブル、銅剤（Zボルドー、コサイド3000など）散布時は葉害が出やすいので混用しないようにしましょう。

キッズ



ちゃぐりんキッズクラブは「食」とそれを支える「農」を五感で学んでもらおうと、女性部や農青連、学校、地域住民、JA職員らが協力し、JA支店を中心とした地域ごとに特色ある食農教育活動を展開しています。

田幸小学校5・6年生



田植え

水稻種まき



河内小学校5・6年生



田植え

和田小学校5年生



田植え

川地保育所



野菜苗、サツマイモ苗の植え付け

吉舎小学校5年生



バケツ稲づくり

川地小学校3年生



田植え

水稻種まき



布野小学校5・6年生



田植え

青河小学校



水稻種まき

田植え



川西小学校3・4年生



サツマイモ苗の植え付け



水稻種まき



みわ保育所



野菜苗、サツマイモ苗の植え付け

君田ちゃぐりん



サツマイモ苗の植え付け

それゆけ!! ちゃぐりん

栗屋小学校3・4年生、栗屋保育所



サツマイモ苗の植え付け

八次小学校5年生



田植え

和田小学校1年生



サツマイモ苗の植え付け

吉舎小学校3年生



山の芋の植え付け

みらさか小学校2年生



ミニトマト苗の植え付け

作木小学校1・2年生



野菜苗の植え付け

さくぎ保育所



野菜苗の植え付け



作木小学校5・6年生



野菜苗の植え付け

酒河小学校4年生



バケツ稲づくり





視察研修で交流 女性部光年部会

J A女性部三次地区本部の光年部会は5月29日、視察研修を行ない部員18人が参加しました。

視察研修では、庄原さとやまオープンガーデンと国営備北丘陵公園を訪れ、ガーデンの見学やバラを鑑賞し部員間の交流を深めました。

光年部会は同女性部の年代別組織として、「経験を生かし、光輝いた生活」をモットーに「家の光」の記事を活用した手芸や視察研修、交流会等の活動を行っています。



▲参加されたみなさん

支部活動

(一社)家の光協会が発行する雑誌「家の光」の記事活用に取り組みました。



▲和田支部 タンポポの花のオイル作り



▲川西支部 料理教室

三次子牛セリ市

令和7年5月28日開催
※最新情報はJA全農ひろしまの
ホームページでご確認ください。

J A三次地域

(円)

	頭数	最高価格	最低価格	平均価格	前月対比
雌	15	667,700	513,700	584,687	-17,645
去勢	20	770,000	319,000	634,150	-83,765
合計	35			612,951	-48,673

市場全体

(円)

	頭数	最高価格	最低価格	平均価格	前月対比
雌	117	673,200	328,900	558,819	-43,513
去勢	168	1,445,400	253,000	659,745	-58,170
合計	285			618,312	-43,312

産直会員の皆様へ

J A全農とれたて元気市 盆期間中の休業日のお知らせ

下記の店舗に出荷を希望される際はご注意ください。

- 広島店
(広島市安佐南区大町東)
- となりの農家店
(東広島市西条町寺家)

**8月15日(金)・16日(土) は
休業いたします。**

※Aコープファーマーズマーケットみやうち店については通常通り営業します。


※インショップ販売と産直集出荷についても通常通り行ないます。

JAグリーンみよし盆休業のお知らせ

8月15日(金)休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

8月のお知らせカレンダー

8月9日(土) ふれあい活動



放送時間 7:00~7:15・12:00~12:15・19:40~19:55

放送日	内 容	担当者
8月4日(月) ~8月10日(日)	水稻 登熟期~刈り取り時期の管理について	行政
8月18日(月) ~8月24日(日)	産直出荷販売情報と玉ねぎの栽培管理について	菊原

※放送内容(予定)は変更になる場合もあります。